

NiN-kartlegging Dønski

Kartleggingsrapport



Dokumentinformasjon

Oppdragsgiver:	Bærum kommune
Tittel på rapport:	Kartleggingsrapport - NiN-kartlegging Dønski
Oppdragsnavn:	Naturtypekartlegging Bærum 2021 - Dønski Kartlegging av naturtyper i byggesonen 2021 Dønski – Bærum sykehus - Gjettum
Oppdragsnummer:	633384-01
Utarbeidet av:	Mari Brøndbo Dahl
Tilgjengelighet:	Åpen

Sammendrag

I forbindelse med Bærum kommunes initiativ for å øke kunnskapsgrunnlaget om sine naturmangfoldverdier, har Asplan Viak gjennomført naturtypekartlegging i et antall mindre skogområder ved Dønski, etter Miljødirektoratets instruks for kartlegging av terrestriske Naturtyper etter NiN2.

Det er kartlagt totalt 37 naturtypelokaliteter innenfor de 12 kartleggingsområdene. Foruten én semi-naturlig eng og én hul eik er alle lokalitetene skogtyper, herunder lågurtfuruskog (1), gammel lågurtgranskog (3), frisk rik edellauvskog (2), frisk lågurtedellauvskog (27), lågurtedellauvskog (1) og kalkhasselskog (1). Lokalitetene har en gjennomsnittlig størrelse på ca. 7000 m², og er stort sett av høy eller svært høy kvalitet.

Resultatene fra kartleggingen publiseres i Naturbase, og kartleggingsrapporten gjøres offentlig tilgjengelig på Asplan Viaks nettsider.

01	1. okt. 2021	Kartleggingsrapport	MBD	KS
Ver	Dato	Beskrivelse	Utarb. av	KS

Innholdsfortegnelse

1. Innledning	4
2. Metode	4
3. Resultater	5
3.1. Nesveien – Vallerkroken (159238)	5
3.2. Solbergåsen (152039)	7
3.3. Søndre Gjettum (164838)	10
3.4. Gjettumlia øst (154439)	11
3.5. Gjettumlia vest (154840)	12
3.6. Samvirkeinstituttet (158038)	13
3.7. Bærum sykehus – Hamangskogen (153238)	14
3.8. Emil Stangs vei (152040)	16
3.9. Helgerud syd (158040)	17
3.10. Helgerud nord (159242)	18
3.11. Dønskitoppen (159639)	19
3.12. Bærum sykehus – Helgerudstiene (152839)	21
3.13. Oppsummering	22
4. Kilder	23
Vedlegg 1	24

1. Innledning


I forbindelse med Bærum kommunes initiativ for å øke kunnskapsgrunnlaget om sine naturmangfoldverdier, har Asplan Viak gjennomført naturtypekartlegging i 12 mindre skogområder ved Dønski og Gjettem i Bærum, etter Miljødirektoratets instruks for kartlegging av terrestriske Naturtyper etter NiN2.

2. Metode

Prosjektområdene ved Dønski og Gjettem (Figur 1) er kartlagt etter Miljødirektoratets instruks for *Kartlegging av terrestriske Naturtyper etter NiN2* (M-1930|2021).

Oppdraget omfatter:

- Kartlegging av naturtyper i 12 polygoner i byggesonen, totalt 372 dekar.
- Levering av kartleggingsdata til Kommunen for implementering i Kommunens kartløsning.
- Levering av kartleggingsdata til Miljødirektoratet for publisering i Naturbase.
- Utarbeidelse av resultatrapport fra oppdraget, som blir offentliggjort på Asplan Viaks hjemmesider.



Figur 1: Kartillustrasjon av prosjektområdene ved Dønski og Gjettem (kilde: Bærum kommune).


Prosjektområdene ble befart av naturforvalter Mari Brøndbo Dahl i august 2021.

Det tas forbehold om at det kan finnes arter i området som ikke ble observert ved kartleggingen. Dette kan skyldes både artenes størrelse og adferd (sannsynligheten for å bli observert), og tidspunktet for kartleggingen - underforstått artenes vekstmønster gjennom sesongen.

3. Resultater

Under presenteres nøkkelinformasjon om lokalitetene som er kartlagt i hvert enkelt delområde. Det henvises til vedlegg 1 for beskrivelser av lokalitetenes tilstand og naturmangfold. Komplette informasjon om lokalitetene er tilgjengelig i Naturbase.

3.1. Nesveien – Vallerkroken (159238)




Figur 2: Kartillustrasjon av registrerte naturtyper i området Nesveien – Vallerkroken. Naturtypene er merket med de siste 5 sifrene i sin NINFP-ID.

ID	NINFP2110039797
Områdenavn	Vallerveien
Naturtype	C18.2 Kalkhasselskog
Kartleggingsenhet(er)	T4-C-4 Kalklågurtskog og T4-C-8 Bærlyng-kalklågurtskog
Størrelse	4819 m ²
Tilstandsvurdering	Moderat
Naturmangfoldvurdering	Stort
Lokalitetskvalitet	Høy kvalitet
Usikkerhet	Hasseldominert kalkrik edellauvskog, men med øvre kronesjikt til stede - derfor noe usikkerhet rundt valg av naturtype. Har likheter (og noe mosaikkipreg) med frisk kalkedelløvskog og lågurtedelløvskog.

ID	NINFP2110039787
Områdenavn	Vallerkroken
Naturtype	C1 Hule eiker
Kartleggingsenhet(er)	T4-C-4 Kalklågurtskog
Størrelse	416 m ²
Tilstandsvurdering	Moderat
Naturmangfoldvurdering	Moderat
Lokalitetskvalitet	Moderat kvalitet

ID	NINFP2110039783
Områdenavn	Nesveien
Naturtype	C17 Lågurtedellauvskog
Kartleggingsenhet(er)	T4-C-3 Lågurtskog og T4-C-7 Bærlyng-lågurtskog
Størrelse	1918 m ²
Tilstandsvurdering	Dårlig
Naturmangfoldvurdering	Stort
Lokalitetskvalitet	Moderat kvalitet

3.2. Solbergåsen (152039)



Figur 3: Kartillustrasjon av registrerte naturtyper i området Solbergåsen. Naturtypene er merket med de siste 5 sifrene i sin NINFP-ID.

ID	NINFP2110039799
Områdenavn	Vallerveien 1
Naturtype	C10 Gammel lågurtgranskog
Kartleggingsenhet(er)	T4-C-3 Lågurtskog og T4-C-7 Bærlyng-lågurtskog
Størrelse	4176 m ²
Tilstandsvurdering	God
Naturmangfoldvurdering	Lite
Lokalitetskvalitet	Moderat kvalitet

ID	NINFP2110039801
Områdenavn	Vallerveien 2
Naturtype	C16.1 Frisk lågurtedellauvskog
Kartleggingsenhet(er)	T4-C-3 Lågurtskog
Størrelse	3721 m ²
Tilstandsvurdering	Moderat
Naturmangfoldvurdering	Stort
Lokalitetskvalitet	Høy kvalitet


ID	NINFP2110039803
Områdenavn	Solbergåsen 1
Naturtype	C10 Gammel lågurtgranskog
Kartleggingsenhet(er)	T4-C-3 Lågurtskog
Størrelse	8732 m ²
Tilstandsvurdering	God
Naturmangfoldvurdering	Moderat
Lokalitetskvalitet	Høy kvalitet
ID	NINFP2110039811
Områdenavn	Solbergåsen 2
Naturtype	C16.1 Frisk lågurtehellauvskog
Kartleggingsenhet(er)	T4-C-3 Lågurtskog
Størrelse	19607 m ²
Tilstandsvurdering	Moderat
Naturmangfoldvurdering	Stort
Lokalitetskvalitet	Høy kvalitet
ID	NINFP2110039805
Områdenavn	Solbergåsen 3
Naturtype	C16.1 Frisk lågurtehellauvskog
Kartleggingsenhet(er)	T4-C-3 Lågurtskog
Størrelse	4404 m ²
Tilstandsvurdering	Moderat
Naturmangfoldvurdering	Stort
Lokalitetskvalitet	Høy kvalitet
ID	NINFP2110039807
Områdenavn	Solbergåsen 4
Naturtype	D2 Semi-naturlig eng
Kartleggingsenhet(er)	T32-C-5 Svakt kalkrik eng med mindre hevdpreg
Størrelse	569 m ²
Tilstandsvurdering	Moderat
Naturmangfoldvurdering	Stort
Lokalitetskvalitet	Høy kvalitet

ID	NINFP2110039809
Områdenavn	Solbergåsen 5
Naturtype	C16.1 Frisk lågurtedellauvskog
Kartleggingsenhet(er)	T4-C-3 Lågurtskog og T4-C-7 Bærlyng-lågurtskog
Størrelse	35763 m ²
Tilstandsvurdering	Moderat
Naturmangfoldvurdering	Stort
Lokalitetskvalitet	Høy kvalitet
Usikkerhet	Øvre deler kunne vært registrert som mosaikk med lågurtgranskog, men gran forekommer ikke sammenhengende i større områder (avveksling med bjørk, furu og edellauvtrær). Noe mosaikkipreg også med tørrere lågurtedellauvskog i øvre deler. Utfordrende å vurdere skogalder i en slik sammensatt teig.

ID	NINFP2110039820
Områdenavn	Solbergåsen 6
Naturtype	C16.1 Frisk lågurtedellauvskog
Kartleggingsenhet(er)	T4-C-3 Lågurtskog
Størrelse	11052 m ²
Tilstandsvurdering	Moderat
Naturmangfoldvurdering	Stort
Lokalitetskvalitet	Høy kvalitet

ID	NINFP2110039848
Områdenavn	Solbergåsen 7
Naturtype	C16.1 Frisk lågurtedellauvskog
Kartleggingsenhet(er)	T4-C-3 Lågurtskog
Størrelse	6512 m ²
Tilstandsvurdering	Moderat
Naturmangfoldvurdering	Stort
Lokalitetskvalitet	Høy kvalitet

3.3. Søndre Gjetum (164838)



Figur 5: Kartillustrasjon av registrerte naturtyper i området Søndre Gjetum. Naturtypen er merket med de siste 5 sifrene i sin NINFP-ID.

ID	NINFP2110041694
Områdenavn	Gjetumstien
Naturtype	C16.1 Frisk lågurtedellauvskog
Kartleggingsenhet(er)	T4-C-3 Lågurtskog
Størrelse	4985 m ²
Tilstandsvurdering	Moderat
Naturmangfoldvurdering	Stort
Lokalitetskvalitet	Høy kvalitet

3.4. Gjettumlia øst (154439)




Figur 4: Kartillustrasjon av registrerte naturtyper i området Gjettumlia øst. Naturtypene er merket med de siste 5 sifrene i sin NINFP-ID.

ID	NINFP2110041734
Områdenavn	Gjettumveien 95
Naturtype	C16.1 Frisk lågurtebellauskog
Kartleggingsenhet(er)	T4-C-3 Lågurtskog
Størrelse	1027 m ²
Tilstandsvurdering	Moderat
Naturmangfoldvurdering	Stort
Lokalitetskvalitet	Høy kvalitet

ID	NINFP2110041740
Områdenavn	Gjettumveien 90
Naturtype	C16.1 Frisk lågurtebellauskog
Kartleggingsenhet(er)	T4-C-3 Lågurtskog
Størrelse	2229 m ²
Tilstandsvurdering	God
Naturmangfoldvurdering	Stort
Lokalitetskvalitet	Svært høy kvalitet

3.5. Gjettumlia vest (154840)



Figur 5: Kartillustrasjon av registrerte naturtyper i området Gjettumlia vest. Naturtypene er merket med de siste 5 sifrene i sin NINFP-ID.

ID	NINFP2110041748
Områdenavn	Blåveissstien 1
Naturtype	C16 Frisk rik edellauvskog
Kartleggingsenhet(er)	T4-C-3 Lågurtskog og T4-C-4 Kalklågurtskog
Størrelse	5974 m ²
Tilstandsvurdering	God
Naturmangfoldvurdering	Stort
Lokalitetskvalitet	Svært høy kvalitet
ID	NINFP2110041755
Områdenavn	Blåveissstien 2
Naturtype	C10 Gammel lågurtgranskog
Kartleggingsenhet(er)	T4-C-3 Lågurtskog og T4-C-4 Kalklågurtskog
Størrelse	5077 m ²
Tilstandsvurdering	God
Naturmangfoldvurdering	Moderat
Lokalitetskvalitet	Høy kvalitet

3.6. Samvirkeinstituttet (158038)




Figur 6: Kartillustrasjon av registrerte naturtyper i området Samvirkeinstituttet. Naturtypene er merket med de siste 5 sifrene i sin NINFP-ID.

ID	NINFP2110041776
Områdenavn	Samvirkeinstituttet 1
Naturtype	C16.1 Frisk lågurtedellauskog
Kartleggingsenhet(er)	T4-C-3 Lågurtskog, T4-C-6 Bærlyng-lågurtskog og T43-C-1 Plener, parker og lignende
Størrelse	5000 m ²
Tilstandsvurdering	Moderat
Naturmangfoldvurdering	Stort
Lokalitetskvalitet	Høy kvalitet

ID	NINFP2110041788
Områdenavn	Samvirkeinstituttet 2
Naturtype	C16.1 Frisk lågurtedellaauvskog
Kartleggingsenhet(er)	T4-C-3 Lågurtskog
Størrelse	3709 m ²
Tilstandsvurdering	Moderat
Naturmangfoldvurdering	Stort
Lokalitetskvalitet	Høy kvalitet

ID	NINFP2110041794
Områdenavn	Samvirkeinstituttet 3
Naturtype	C7.1 Lågurtfuruskog
Kartleggingsenhet(er)	T4-C-3 Lågurtskog og T4-C-7 Bærlyng-lågurtskog
Størrelse	2362 m ²
Tilstandsvurdering	Moderat
Naturmangfoldvurdering	Stort
Lokalitetskvalitet	Høy kvalitet

3.7. Bærum sykehus - Hamangskogen (153238)



Figur 7: Kartillustrasjon av registrerte naturtyper i området Hamangskogen. Naturtypene er merket med de siste 5 sifrene i sin NINFP-ID.

ID	NINFP2110046771
Områdenavn	Hamangskogen 1
Naturtype	C16.1 Frisk lågurte dellauvskog
Kartleggingsenhet(er)	T4-C-3 Lågurtskog
Størrelse	9363 m ²
Tilstandsvurdering	Moderat
Naturmangfoldvurdering	Stort
Lokalitetskvalitet	Høy kvalitet

ID	NINFP2110046954
Områdenavn	Hamangskogen 2
Naturtype	C16.1 Frisk lågurte dellauvskog
Kartleggingsenhet(er)	T4-C-3 Lågurtskog
Størrelse	9529 m ²
Tilstandsvurdering	Moderat
Naturmangfoldvurdering	Stort
Lokalitetskvalitet	Høy kvalitet

ID	NINFP2110045841
Områdenavn	Hamangskogen 3
Naturtype	C16.1 Frisk lågurte dellauvskog
Kartleggingsenhet(er)	T4-C-3 Lågurtskog
Størrelse	3499 m ²
Tilstandsvurdering	Moderat
Naturmangfoldvurdering	Stort
Lokalitetskvalitet	Høy kvalitet

3.8. Emil Stangs vei (152040)



Figur 8: Kartillustrasjon av registrerte naturtyper i området Emil Stangs vei. Naturtypene er merket med de siste 5 sifrene i sin NINFP-ID.

ID	NINFP2110045369
Områdenavn	Emil Stangs vei 1
Naturtype	C16.1 Frisk lågurtehellauvskog
Kartleggingsenhet(er)	T4-C-3 Lågurtskog
Størrelse	10263 m ²
Tilstandsvurdering	Moderat
Naturmangfoldvurdering	Stort
Lokalitetskvalitet	Høy kvalitet

ID	NINFP2110045385
Områdenavn	Emil Stangs vei 2
Naturtype	C16.1 Frisk lågurtehellauvskog
Kartleggingsenhet(er)	T4-C-3 Lågurtskog og T4-C-7 Bærlyng-lågurtskog
Størrelse	13984 m ²
Tilstandsvurdering	Moderat
Naturmangfoldvurdering	Stort
Lokalitetskvalitet	Høy kvalitet

3.9. Helgerud syd (158040)




Figur 9: Kartillustrasjon av registrerte naturtyper i området Helgerud syd. Naturtypene er merket med de siste 5 sifrene i sin NINFP-ID.

ID	NINFP2110045436
Områdenavn	Dønskistien 1
Naturtype	C16.1 Frisk lågurtehellauvskog
Kartleggingsenhet(er)	T4-C-3 Lågurtskog
Størrelse	3381 m ²
Tilstandsvurdering	God
Naturmangfoldvurdering	Stort
Lokalitetskvalitet	Svært høy kvalitet

ID	NINFP2110045444
Områdenavn	Dønskistien 2
Naturtype	C16.1 Frisk lågurtehellauvskog
Kartleggingsenhet(er)	T4-C-3 Lågurtskog
Størrelse	15886 m ²
Tilstandsvurdering	Moderat
Naturmangfoldvurdering	Stort
Lokalitetskvalitet	Høy kvalitet

3.10. Helgerud nord (159242)



Figur 10: Kartillustrasjon av registrerte naturtyper i området Helgerud nord. Naturtypene er merket med de siste 5 sifrene i sin NINFP-ID.

ID	NINFP2110046778
Områdenavn	Helgerud 1
Naturtype	C16.1 Frisk lågurtedellauvskog
Kartleggingsenhet(er)	T4-C-3 Lågurtskog
Størrelse	2668 m ²
Tilstandsvurdering	Moderat
Naturmangfoldvurdering	Stort
Lokalitetskvalitet	Høy kvalitet


ID	NINFP2110046772
Områdenavn	Helgerud 2
Naturtype	C16.1 Frisk lågurtedellauvskog
Kartleggingsenhet(er)	T4-C-3 Lågurtskog
Størrelse	10524 m ²
Tilstandsvurdering	Moderat
Naturmangfoldvurdering	Stort
Lokalitetskvalitet	Høy kvalitet

The map shows a residential area with several buildings and green spaces. A red line outlines a specific area of interest. The map is color-coded with green for vegetation and brown for buildings. Labels include 'DØNSKI', 'Carpe Diem demenslandsby', and various street names like 'Vebekkveien' and 'Dønski'. A scale bar indicates 1:500.

ID	NINFP2110046776
Områdenavn	Dønskitoppen 1
Naturtype	C16.1 Frisk lågurtedellauvskog
Kartleggingsenhet(er)	T4-C-3 Lågurtskog
Størrelse	5517 m ²
Tilstandsvurdering	God
Naturmangfoldvurdering	Stort
Lokalitetskvalitet	Svært høy kvalitet

ID	NINFP2110046773
Områdenavn	Dønkitoppen 2
Naturtype	C16.1 Frisk lågurte dellauvskog
Kartleggingsenhet(er)	T4-C-3 Lågurtskog
Størrelse	9685 m ²
Tilstandsvurdering	Moderat
Naturmangfoldvurdering	Stort
Lokalitetskvalitet	Høy kvalitet
ID	NINFP2110046775
Områdenavn	Dønkitoppen 3
Naturtype	C16.1 Frisk lågurte dellauvskog
Kartleggingsenhet(er)	T4-C-3 Lågurtskog
Størrelse	9476 m ²
Tilstandsvurdering	Moderat
Naturmangfoldvurdering	Stort
Lokalitetskvalitet	Høy kvalitet
Usikkerhet	Delvis kartlagt fra avstand fordi et anleggsgjerde sperrer for ferdsel.
ID	NINFP2110046777
Områdenavn	Dønkitoppen 4
Naturtype	C16.1 Frisk lågurte dellauvskog
Kartleggingsenhet(er)	T4-C-3 Lågurtskog
Størrelse	1030 m ²
Tilstandsvurdering	Moderat
Naturmangfoldvurdering	Stort
Lokalitetskvalitet	Høy kvalitet
ID	NINFP2110048555
Områdenavn	Dønkitoppen 5
Naturtype	C16.1 Frisk lågurte dellauvskog
Kartleggingsenhet(er)	T4-C-3 Lågurtskog
Størrelse	4338 m ²
Tilstandsvurdering	Moderat
Naturmangfoldvurdering	Stort
Lokalitetskvalitet	Høy kvalitet

3.12. Bærum sykehus – Helgerudstiene (152839)



Figur 12: Kartillustrasjon av registrerte naturtyper i området Helgerudstiene. Naturtyperne er merket med de siste 5 sifrene i sin NINFP-ID.

ID	NINFP2110045396
Områdenavn	Sykehusstien 1
Naturtype	C16 Frisk rik lågurtedellauvskog
Kartleggingsenhet(er)	T4-C-3 Lågurtskog og T4-C-4 Kalklågurtskog
Størrelse	4887 m ²
Tilstandsvurdering	Moderat
Naturmangfoldvurdering	Stort
Lokalitetskvalitet	Høy kvalitet

ID	NINFP2110045407
Områdenavn	Sykehusstien 2
Naturtype	C16.1 Frisk lågurtedellauvskog
Kartleggingsenhet(er)	T4-C-3 Lågurtskog
Størrelse	4166 m ²
Tilstandsvurdering	Moderat
Naturmangfoldvurdering	Stort
Lokalitetskvalitet	Høy kvalitet

ID	NINFP2110045413
Områdenavn	Sykehusstien 3
Naturtype	C16.1 Frisk lågurtedellauvskog
Kartleggingsenhet(er)	T4-C-3 Lågurtskog, T4-C-4 Kalklågurtskog og T4-C-7 Bærlyng-lågurtskog
Størrelse	10238 m ²
Tilstandsvurdering	Moderat
Naturmangfoldvurdering	Stort
Lokalitetskvalitet	Høy kvalitet
Usikkerhet	Andelen gran er ca. 40 % og det er ingen tydelig mosaikk med gammel lågurtgranskog, men lokaliteten har tydelige likheter med denne naturtypen.

3.13. Oppsummering

Det er kartlagt totalt 37 naturtypelokaliteter innenfor de 12 kartleggingsområdene. Foruten én semi-naturlig eng (D2) og én hul eik (C1), er alle lokalitetene skogtyper:

C7.1	Lågurtfuruskog	1 stk
C10	Gammel lågurtgranskog	3 stk
C16	Frisk rik edellauvskog	2 stk
C16.1	Frisk lågurtedellauvskog	27 stk
C17	Lågurtedellauvskog	1 stk
C18.2	Kalkhasselskog	1 stk

Lokalitetene har en gjennomsnittlig størrelse på ca. 7000 m², og er stort sett av høy eller svært høy kvalitet.

4. Kilder

Artsdatabanken (u.å.) Artskart. Tilgjengelig fra: <https://artskart.artsdatabanken.no/>

Artsdatabanken (2018) *Norsk rødliste for naturtyper 2018*. Tilgjengelig fra:
<https://www.artsdatabanken.no/rodlistefornaturtyper>

Artsdatabanken (2015) *Rødliste for arter*. Tilgjengelig fra:
<https://www.artsdatabanken.no/Rodliste>

Forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (FOR-2011-05-13-512)

Lov om forvaltning av naturens mangfold, Naturmangfoldloven (LOV-2009-06-19-100)

Miljødirektoratet (u.å.) *Naturbase kart*. Tilgjengelig fra: <https://kart.naturbase.no/>

Miljødirektoratet (2021) *Kartleggingsinstruks – Kartlegging av terrestriske Naturtyper etter NiN2. Veileder M-1930*. Tilgjengelig fra:
<https://ninkartlegging.miljodirektoratet.no/>

Vedlegg 1

Utfyllende informasjon om lokalitetene; beskrivelse av tilstand og naturmangfold.

Tilstandsbeskrivelse	Naturmangfoldbeskrivelse
<i>NINFP2110039797 - Vallerveien</i>	
Tilstanden vurderes som moderat på grunn av skogbestandsdynamikk og spor etter slitasje. Teigen er vurdert til gjennomsnittlig hogstklasse 4 (eldre produksjonsskog). Området benyttes som nærturterreng og har noe slitasje fra tråkk, både på og utenfor sti. For øvrig er dekning av gran og bøk hhv. lav og ubetydelig. Busksjiktsdekningen er også lav (5-10 %). Svak effekt av fremmedarter med spredte hagebusker, bl.a. mispel og høstberberis. Ingen spor etter tunge kjøretøy.	Blandingsskog med sammenhengende hasselsjikt på kalkrik grunn. Hovedsakelig grove gran, furu og bjørk i øvre sjikt, i tillegg rogn, selje, spisslønn, ask og lind. Typiske arter dominerer feltsjikt; blåveis, trollbær, kantkonvall, svarterteknapp (habitatspesifikk), markjordbær, teiebær, skogvikke, kranskonvall, liljekonvall, skogfiol, kratthumleblom, fredløs, gullris og lakrismjelt, samt leddved, bringebær og mjødukt. Stubbesyl, ekornmose og rødbrandkjuke observert på flere gran- og furulåg. Naturmangfold vurderes som stort på grunn av antall store trær (4-8 per daa). Størrelsen er moderat (> 2000 m ²). Det finnes for øvrig få habitatspesifikke arter (én), og området beites ikke. En 'hul eik' ligger innenfor lokaliteten. Det ble ikke observert hule lauvtrær. Ingen rødlistearter ble registrert og ingen rødlistearter er kjent fra før.
<i>NINFP2110039787 - Vallerkroken</i>	
Tilstand vurderes som moderat på grunn av noe høy busksjiktsdekning og dekning av gjenveksttrær (hhv. 25-50 og 10-25 %). Eika er beskåret ut mot vegen.	Naturmangfold vurderes som moderat på grunn av små barksprekker. Eika er såvidt over 200 cm i omkrets, og er frisk og uten hulrom. Ingen rødlistearter ble registrert og ingen rødlistearter er kjent fra før.
<i>NINFP2110039783 - Nesveien</i>	
Tilstand vurderes som dårlig fordi skogen er ung (yngre produksjonsskog). Dekningen av gran og einstape er lav, stort sett fraværende. Tett hasselsjikt hindrer busksjikt fra å etablere seg. Svak effekt av fremmedarter med spredte hagebusker, bl.a. mispel og høstberberis. Ingen spor etter ferdsel med tunge kjøretøy, men en del spor etter menneskelig påvirkning, herunder søppel, hageavfall, betong og tilført stein.	Ungt hasselkratt på bærlyng-lågurtmark. Spredte ask og spisslønn har utviklet sprekkebark, og det finnes en og annen rogn, bjørk, gran og furu. Foruten oppslag av ask ble typiske arter observert i feltsjikt; markjordbær, teiebær, skogvikke, liljekonvall, kranskonvall, skogfiol og lakrismjelt, samt leddved i busksjikt. Noe død ved av små dimensjoner etter rydding. Naturmangfold vurderes som stort på grunn av antall trær med spesielt livsmedium, herunder trær med sprekkebark (4-8 pr. daa). For øvrig lite død ved, ingen store trær, og ingen habitatspesifikke arter observert. Ingen rødlistearter ble registrert og ingen rødlistearter er kjent fra før. Området beites ikke og er relativt lite (< 5000 m ²).

<i>NINFP2110039799 – Vallerveien 1</i>	
Tilstanden vurderes som god fordi det ikke er spor etter foryngelsestiltak eller ferdsel med tunge kjøretøy, og ingen fremmedarter er registrert. Det forekommer imidlertid en hel del søppel (store gjenstander).	Grandominert lågurtskog med hassel i undersjikt. Naturmangfold vurderes som lite på grunn av lite liggende død ved (1-2 per daa) og fravær av habitatspesifikke arter. Det ble registrert få sopparter i området, men bl.a. steinsopp og flatklokkehatt ble observert. Feltsjikt sparsomt utviklet, men med typiske lågurtarter som blåveis, teiebær, leddved, skogfiol, kranskonvall, liljekonvall, gullris og markjordbær. Ingen rødlistearter ble registrert og ingen rødlistearter er kjent fra før. Området beites ikke og er relativt lite (< 5000 m2).
<i>NINFP2110039801 – Vallerveien 2</i>	
Tilstanden vurderes som moderat på grunn av teigens alder (skogbestandsdynamikk). Teigen er vurdert til gjennomsnittlig hogstklasse 4 (eldre produksjonsskog), med grove overstendere og yngre hasselkratt. Innslaget av gran er ubetydelig og busksjiktdeknningen er lav (5-10 %) under hasselsjiktet. Ingen fremmedarter eller soppangrep observert, og ingen spor etter ferdsel med tunge kjøretøy.	Hassel i undersjikt, overstendere av grove bjørk med sprekkebark, samt spisslønn, osp og ask. Feltsjikt sparsomt utviklet grunnet lite lys til bakken, men med typiske lågurtarter finnes: blåveis, teiebær, leddved, skogfiol, kranskonvall, liljekonvall, kantkonvall, gullris og markjordbær. Mandelkremle også observert. Naturmangfold vurderes som stort på grunn av antall store trær (2-4 per daa) og trær med spesielt livsmedium, herunder trær med sprekkebark (2-4 pr. daa). For øvrig lite død ved (0-1 per daa), og ingen habitatspesifikke arter observert. Ingen rødlistearter ble registrert og ingen rødlistearter er kjent fra før. Området beites ikke og er relativt lite (< 5000 m2).
<i>NINFP2110039803 – Solbergåsen 1</i>	
Tilstanden vurderes som god fordi det ikke er spor etter foryngelsestiltak eller ferdsel med tunge kjøretøy, og ingen fremmedarter er registrert. Det går flere stier gjennom området, men disse utgjør ikke betydelig slitasje.	Grandominert lågurtskog med hassel i undersjikt. Naturmangfold vurderes som moderat på grunn av størrelsen (> 5000 m2). Ellers lite liggende død ved (1-2 per daa) og fravær av habitatspesifikke arter. Det ble registrert få sopparter i området, men bl.a. mandelkremle ble observert samt rødrandkjuke på granlåg. Feltsjikt med typiske lågurtarter som blåveis, teiebær, leddved, skogfiol, kranskonvall, liljekonvall, gullris og markjordbær. Ingen rødlistearter ble registrert og ingen rødlistearter er kjent fra før. Området beites ikke.
<i>NINFP2110039811 – Solbergåsen 2</i>	
Tilstanden vurderes som moderat på grunn av teigens alder (skogbestandsdynamikk). Teigen er vurdert til gjennomsnittlig hogstklasse 4 (eldre produksjonsskog), med grove overstendere og undersjikt av yngre hasselkratt. Det er noe gran, men ikke over 12,5 %. Busksjiktdeknningen er lav under hasselsjiktet (5-10 %), og det ble ikke observert særlig effekt av fremmedarter eller soppangrep. Det er ingen spor etter ferdsel med tunge kjøretøy, foruten gangveien som går gjennom vestre del av lokaliteten.	Lokaliteten er en frisk lågurtedellauvskog, med sammenhengende hasselsjikt under overstendere av grove bjørk, furu, gran, ask og spisslønn med sprekkebark. Høyere andel gran og furu i øvre del, mens det i nedre del hovedsakelig er edellauvtrær, med innslag av eik, alm og lind i tillegg til ask og spisslønn. Stedvis noe død ved grunnet rotvelt, men lite kontinuitet i død ved. Feltsjikt varierende, stedvis sparsomt utviklet grunnet lite lys til bakken, men med typiske lågurtarter: blåveis, teiebær, leddved, skogfiol, kranskonvall, liljekonvall, skogsalat og markjordbær. Naturmangfold vurderes som stort på grunn av antall store trær (4-8 per daa) og trær med spesielt livsmedium, herunder trær med sprekkebark (4-8 per daa). For øvrig lite død ved av stor dimensjon (0-1 per daa), og ingen habitatspesifikke arter observert. Ingen

	rødlistearter ble registrert og ingen rødlistearter er kjent fra før. Området beites ikke, og har moderat størrelse (ca. 20 000 m ²).
<i>NINFP2110039805 - Solbergåsen 3</i>	
Tilstanden vurderes som moderat på grunn av teigens alder (skogbestandsdynamikk). Teigen er vurdert til gjennomsnittlig hogstklasse 4 (eldre produksjonsskog), med grove overstendere og undersjikt av yngre hasselkratt. Det er noe gran, men ikke over 12,5 %. Busksjiktsdekningen er lav under hasselsjiktet (5-10 %), og det ble ikke observert soppangrep. Svak effekt av fremmedarter ut mot åpne områder i øst, sør og vest. Det er ingen spor etter ferdsel med tunge kjøretøy inne i lokaliteten.	Lokaliteten er en frisk lågurtedellauvskog, med sammenhengende hasselsjikt under overstendere av grove bjørk, furu, gran, ask og spisslønn med sprekkebark. Lind og alm i samme sjikt som hassel. Stedvis noe død ved grunnet rotvelt, men lite kontinuitet. Feltsjikt varierende, stedvis sparsomt utviklet grunnet lite lys til bakken, men med typiske lågurtarter: blåveis, teiebær, leddved, skogfiol, kranskonvall, liljekonvall, skogsalat og markjordbær. Naturmangfold vurderes som stort på grunn av antall store trær (4-8 per daa) og trær med spesielt livsmedium, herunder trær med sprekkebark (4-8 per daa). For øvrig lite død ved av stor dimensjon (1-2 per daa), og ingen habitatspesifikke arter observert. Nordvest i lokaliteten ble det registrert kjempeslørsopp (VU) i 2008. Arten ble ikke observert ved kartleggingen i 2021, men det er ingen grunn til å tro at arten har forsvunnet fra området permanent. Det ble ikke registrert andre rødlistede arter. Lokaliteten er relativt liten (> 5000 m ²) og beites ikke.
<i>NINFP2110039807 - Solbergåsen 4</i>	
Lokaliteten ligger i unnarennet av Solbergbakken, en hoppbakke som var i drift mellom 1888 og 1992. Det er få installasjoner tilbake, men det antas at bakken holdes åpen med slått e.l. grunnet fortsatt fravær av vedvekster. Lokaliteten vurderes til brakkleggingsfase og svært ekstensiv bruk. Gjengroing pågår inn fra sidene (grenser til rik edellauvskog på begge sider). Lokaliteten bærer ikke preg av gjødsling, men har noe innslag av fremmedarter (kanadagullris, kjempebjørnekjeks, villgulrot). Tilstanden vurderes som moderat grunnet suksessjon og bruksintensitet.	Naturmangfold vurderes som stort på grunn av forekomst av 12 habitatspesifikke arter (moderat = 9-14 arter), samt to nær truede arter (stjernetistel og legesteinfrø). Begge sistnevnte var registrert fra tidligere, og ble igjen observert ved kartleggingen. For øvrig liten størrelse (ca. 600 m ²), og få NiN-kartleggingsenheter (1). I feltsjikt dominerer villgulrot (LO), men det finnes også stjernetistel (NT), legesteinfrø (NT), engknoppurt, enghumleblom, lakrismjelt, blåklokke, fagerklokke, tiriltunge, kransmynte, prestekrage, gulflatbelg, rundbelg, åkermåne, smalkjempe, firkantperikum, engsmelle, hvitmaure, stormaure, smørbukk, ryllik, markjordbær, skogsveve og flere arter kløver.
<i>NINFP2110039809 - Solbergåsen 5</i>	
Tilstanden vurderes som moderat på grunn av teigens alder (skogbestandsdynamikk). Teigen er vurdert til gjennomsnittlig hogstklasse 4 (eldre produksjonsskog), med grove overstendere (bjørk, gran, furu, ask, spisslønn) og undersjikt av yngre hasselkratt. Det er en del gran i øvre del (nær mosaikk med lågurtgranskog), men ikke over 25 %. Busksjiktsdekningen er lav (5-10 %) under hasselsjiktet, og det ble ikke observert særlig effekt av fremmedarter eller soppangrep. Ingen spor	Lokaliteten er en frisk lågurtedellauvskog, med sammenhengende hasselsjikt under overstendere av grove bjørk, furu, gran, ask og spisslønn med sprekkebark. Høy andel gran i øvre del, nær mosaikk med lågurtgranskog. I nedre del hovedsakelig edellauvtrær, med innslag av alm og lind i tillegg til ask og spisslønn. Stedvis mye død ved grunnet rotvelt (i hovedsak gran), men lite kontinuitet i død ved. Feltsjikt varierende, stedvis sparsomt utviklet grunnet lite lys til bakken, men med typiske lågurtarter: blåveis, teiebær, leddved, skogfiol, kranskonvall, liljekonvall, skogsalat og markjordbær. Noe sopp, bl.a. rødrandkjuke, fiolkjuke, hvit rynkesopp, mandelkremle, brunskrubbe, ringløs smørsopp, bjørkeøsterssopp og rød fluesopp. Naturmangfold vurderes som stort på grunn av størrelsen (> 25 000 m ²) og antall

etter ferdsel med tunge kjøretøy, men det går et par stier igjennom området da det benyttes som nærturterreng.	store trær (4-8 per daa) og trær med spesielt livsmedium, herunder trær med sprekkebark (4-8 per daa). For øvrig lite død ved av stor dimensjon (1-2 per daa) og ingen habitatspesifikke arter observert. Ingen rødlistearter ble registrert og ingen rødlistearter er kjent fra før. Området beites ikke.
<i>NINFP2110039820 - Solbergåsen 6</i>	
Tilstanden vurderes som moderat på grunn av teigens alder (skogbestandsdynamikk). Teigen er vurdert til gjennomsnittlig hogstklasse 4 (eldre produksjonsskog), med grove overstendere og undersjikt av yngre hasselkratt. Det er en del gran (og furu), men ikke over 25 %. Busksjiktdeknningen er lav under hasselsjiktet (5-10 %), og det ble ikke observert fremmedarter eller soppangrep. Det er ingen spor etter ferdsel med tunge kjøretøy, men en del stier krysser området	Lokaliteten er en frisk lågurtedellauvskog i bratt sørvendt skråning, med sammenhengende hasselsjikt under overstendere av grove bjørk, furu, gran, ask og spisslønn med sprekkebark. Lind og alm i samme sjikt som hassel. Stedvis noe død ved grunnet rotvelt, men lite kontinuitet. Feltsjikt varierende, stedvis sparsomt utviklet grunnet lite lys til bakken, men med typiske lågurtarter: blåveis, teiebær, leddved, skogfiol, kranskonvall, liljekonvall, skogsalat og markjordbær. Naturmangfold vurderes som stort på grunn av antall store trær (4-8 per daa) og trær med spesielt livsmedium, herunder trær med sprekkebark (4-8 pr. daa). For øvrig lite død ved av stor dimensjon (1-2 per daa) og ingen habitatspesifikke arter observert. Ingen rødlistearter ble registrert og ingen rødlistearter er kjent fra før. Lokaliteten har moderat størrelse (ca. 11 000 m2) og beites ikke.
<i>NINFP2110039848 - Solbergåsen 7</i>	
Tilstanden vurderes som moderat på grunn av teigens alder (skogbestandsdynamikk). Teigen er vurdert til gjennomsnittlig hogstklasse 4 (eldre produksjonsskog), med grove overstendere og undersjikt av yngre hasselkratt. Det er noe gran (og furu), men ikke over 12,5 %. Busksjiktdeknningen er lav under hasselsjiktet (5-10 %), og det ble ikke observert fremmedarter eller soppangrep. Det er ingen spor etter ferdsel med tunge kjøretøy, men en del stier krysser området.	Lokaliteten er en frisk lågurtedellauvskog i bratt sørvendt skråning, med sammenhengende hasselsjikt under overstendere av grove ask med sprekkebark. Lind og alm i samme sjikt som hassel. Typiske lågurtarter i feltsjikt: blåveis, teiebær, leddved, skogfiol, kranskonvall, liljekonvall, kantkonvall, skogsalat og markjordbær. I tillegg flere gamle stubber med sopp, bl.a. rødrandkjuke, flatkjuke og pærerøysopp. Naturmangfold vurderes som stort på grunn av antall trær med spesielt livsmedium, herunder trær med sprekkebark (2-4 pr. daa). For øvrig lite død ved av stor dimensjon (1-2 per daa), enkelte store trær (2-4 per daa), og ingen habitatspesifikke arter observert. Ingen rødlistearter ble registrert og ingen rødlistearter er kjent fra før. Lokaliteten har moderat størrelse (ca. 6500 m2) og beites ikke.
<i>NINFP2110041694 - Gjettumstien</i>	
Tilstanden vurderes som moderat på grunn av teigens alder (skogbestandsdynamikk). Teigen er vurdert til gjennomsnittlig hogstklasse 4 (eldre produksjonsskog), med grove overstendere og undersjikt av yngre hasselkratt. Det er noe gran, men ikke over 12,5 %. Busksjiktdeknningen er lav under hasselsjiktet (5-10 %), og det er ikke observert soppangrep eller spor etter ferdsel med tunge kjøretøy. Det går imidlertid en opparbeidet sti gjennom området. Fremmedartseffekten vurderes til gjennomsnittlig	Lokaliteten er en frisk lågurtedellauvskog, med hasselsjikt under overstendere av spisslønn, bjørk, gran, furu, alm og ask. I tillegg noe rogn og gråor. Feltsjikt varierende, og stedvis sparsomt utviklet grunnet lite lys til bakken, men med typiske lågurtarter: liljekonvall, kranskonvall, skogsalat, trollbær, markjordbær, blåveis, skogvikke, kratthumleblom, kantkonvall, knollerteknapp og skogfiol. Hasselkjuke observert på hassel. Naturmangfold vurderes som stort på grunn av antall trær med spesielt livsmedium, herunder trær med sprekkebark (2-4 pr. daa). For øvrig lite liggende død ved av stor dimensjon (0-1 per daa), få store trær (2-3 per daa), og ingen habitatspesifikke arter observert. En del død ved av små dimensjoner. Ingen rødlistearter ble registrert og ingen rødlistearter er kjent fra før. Området beites ikke, og har liten/moderat størrelse (ca. 5000 m2).

'svak', men den er betydelig i de områdene det er dumpeplasser for hageavfall. Gravmyrt og mispel er mest fremtredende. Småsåppel finnes spredt.	
<i>NINFP2110041734 - Gjettumveien 95</i>	
Tilstanden vurderes som moderat på grunn av teigens alder (skogbestandsdynamikk). Teigen er vurdert til gjennomsnittlig hogstklasse 4 (eldre produksjonsskog). Dekningen av gran samt busksjiksdekningen er lav (5-10 %), og det er ikke observert fremmedarter, soppangrep eller spor etter ferdsel med tunge kjøretøy.	Lokaliteten er en frisk lågurtedellauvskog i sørvendt helling - noe raspreget. Hasselsjikt under overstendere av spisslønn, alm, ask, lind, bjørk og osp, hvorav flere grove. Feltsjikt varierende, og stedvis sparsomt utviklet grunnet lite lys til bakken og/eller lite/ustabilt jordsmonn, men med typiske lågurtarter: liljekonvall, teiebær, markjordbær, kratthumleblom, skogsvinerot og skvallerkål. Naturmangfold vurderes som stort på grunn av antall store trær (4-8 per daa) og trær med spesielt livsmedium, herunder trær med sprekkebark (8-16 per daa). For øvrig lite liggende død ved av stor dimensjon (0 per daa), og ingen habitatspesifikke arter observert. Ingen rødlistearter ble registrert og ingen rødlistearter er kjent fra før. Området beites ikke, og er relativt lite (ca. 1000 m2).
<i>NINFP2110041740 - Gjettumveien 90</i>	
Tilstanden vurderes som god. Skogalder vurderes til gammel normalskog. Dekningen av gran samt busksjiksdekningen er lav (hhv. < 6,25 % og 5-10 %), og det er ikke observert fremmedarter, soppangrep eller spor etter ferdsel med tunge kjøretøy.	Området er inngjerdet og er kartlagt fra utsiden av gjerdet. Lokaliteten er en frisk lågurtedellauvskog. Hasseldominert iblandet alm, ask og bjørk, og med enkelte grove ask ut mot vegen. Stedvis står hasseltrærne så systematisk at de fremstår plantet. Feltsjikt med typiske lågurtarter: liljekonvall, kratthumleblom, kranskonvall, teiebær, skvallerkål og leddved. Naturmangfold vurderes som stort på grunn av antall trær med spesielt livsmedium, herunder trær med sprekkebark (2-4 per daa). For øvrig enkelte store trær (2-4 per daa), men lite liggende død ved av stor dimensjon (0 per daa), og ingen habitatspesifikke arter observert. Ingen rødlistearter ble registrert og ingen rødlistearter er kjent fra før. Området beites ikke, og er relativt lite (ca. 2200 m2).
<i>NINFP2110041748 - Blåveisstien 1</i>	
Tilstanden vurderes som god. Skogalder vurderes til gammel normalskog. Dekningen av gran samt busksjiksdekningen er lav (hhv. < 12,5 % og 5-10 %), og det er ikke observert fremmedarter, soppangrep eller spor etter ferdsel med tunge kjøretøy.	Lokaliteten er en frisk rik edellauvskog, der deler er lågurtedelløvskog og deler er kalkedelløvskog. Deler av området er inngjerdet med hengelås. Tresjiktet har et sammenhengende undersjikt av hassel, med overstandere av alm, gran, spisslønn ask og eik. Det finnes flere store grove ask og eik, særlig i lavereliggende deler. Noen ask også hule. Øvre deler av området har høy andel gran, men ikke over 25 %. Kjuke og sopp finnes spredt på læger og gadder, og på bakken. Feltsjikt med typiske lågurtarter: liljekonvall, blåveis, skogvikke, knollerteknapp, kratthumleblom, markjordbær, teiebær, firblad, blodstorkenebb og trollbær. Naturmangfold vurderes som stort på grunn av antall store trær (8-16 per daa) og trær med spesielt livsmedium, herunder trær med sprekkebark (16-32 per daa). For øvrig finnes enkelte hule lauvtrær (1-2 per daa), men lite liggende død ved av stor dimensjon (0-1 per daa), og ingen habitatspesifikke arter er observert. Ingen rødlistearter ble registrert og

	ingen rødlistearter er kjent fra før. Området beites ikke, og er av moderat størrelse (> 5000 m ²).
<i>NINFP2110041755 - Blåveisstien 2</i>	
Tilstanden vurderes som god fordi området er uten fremmedarter, foryngelsestiltak og spor etter ferdsel med tunge kjøretøy.	Granskog med undersjikt av hassel. Gransjikt iblandet spisslønn, selje, ask, rogn og bjørk. Feltsjikt med typiske lågurtarter (flekvis rikere): kranskonvall, liljekonvall, blåveis, skogvikke, knollerteknapp, kratthumbleblom, markjordbær, teiebær, blodstorkenebb, kantkonvall, skogsalat og kristtorn. Naturmangfold vurderes som moderat på grunn av størrelsen (> 5000 m ²) og mengden liggende død ved av stor dimensjon (2-4 per daa). Det er ikke observert habitatspesifikke arter, men kjuker og sopp finnes spredt på læger og gadder, og på bakken. Blant annet en del kremler. Ingen rødlistearter ble registrert og ingen rødlistearter er kjent fra før (med unntak av alm og ask). Området er ikke beitet.
<i>NINFP2110041776 - Samvirkeinstituttet 1</i>	
Tilstanden vurderes som moderat på grunn av skogbestandsdynamikken (eldre produksjonsskog). Dekningen av gran samt busksjiktdeknningen er lav (hhv. < 12,5 % og 5-10 %), og det er ikke observert soppangrep eller spor etter ferdsel med tunge kjøretøy. Svak effekt av fremmedarter, noe snøbær og gravmyrt.	Lågurtedellauvskog med hassel og grove overstendere av ask og spisslønn. Stedvis grunnlendt. Feltsjikt med typiske lågurtarter: kratthumbleblom, liljekonvall, skogsalat, blodstorkenebb, leddved, kranskonvall, trollbær, smørbukk og markjordbær. Naturmangfold vurderes som stort på grunn av antall store trær (4-8 per daa) og trær med spesielt livsmedium, herunder trær med sprekkebark (8-16 per daa). For øvrig finnes lite liggende død ved av stor dimensjon (0-1 per daa), og ingen habitatspesifikke arter. Ingen rødlistearter ble registrert og ingen rødlistearter er kjent fra før. Området beites ikke, og er av moderat størrelse (ca. 5000 m ²).
<i>NINFP2110041788 - Samvirkeinstituttet 2</i>	
Tilstanden vurderes som moderat på grunn av skogbestandsdynamikken (eldre produksjonsskog). Dekningen av gran samt busksjiktdeknningen er lav (hhv. < 6,25 % og 5-10 %), og det er ikke observert fremmedarter, soppangrep eller spor etter ferdsel med tunge kjøretøy.	Lågurtedellauvskog med hassel og grove overstendere av ask, spisslønn og bjørk (varierende alder). Innslag av furu og gran i vestlig del. Feltsjikt med typiske lågurtarter: trollbær, liljekonvall, markjordbær, skogsalat, blodstorkenebb, kranskonvall og teiebær. Naturmangfold vurderes som stort på grunn av antall store trær (4-8 per daa) og trær med spesielt livsmedium, herunder trær med sprekkebark (4-8 per daa). For øvrig finnes lite liggende død ved av stor dimensjon (0-1 per daa), og ingen habitatspesifikke arter. Ingen rødlistearter ble registrert og ingen rødlistearter er kjent fra før. Området beites ikke, og er relativt lite (< 5000 m ²).
<i>NINFP2110041794 - Samvirkeinstituttet 3</i>	
Tilstanden vurderes som moderat på grunn av skogbestandsdynamikken (eldre produksjonsskog). Busksjiktdeknningen er relativt lav (< 10-25 %), og deknningen kalkgrønnaks, snerprørkvein og einstape er ubetydelig. Det er ikke observert fremmedarter, spor	Furuskog med hasselsjikt, iblandet ask, bjørk, rogn og eik. Feltsjikt med blåbærlyng og typiske lågurtarter: liljekonvall, markjordbær, teiebær og firkantperikum. Naturmangfold vurderes som stort på grunn av mengden stående død ved med stor dimensjon (1-2 gadder per daa). For øvrig finnes lite liggende død ved av stor dimensjon (0-1 per daa), og ingen habitatspesifikke

etter slitasje og slitasjebetinget erosjon, eller spor etter ferdsel med tunge kjøretøy.	arter. Ingen rødlistearter ble registrert og ingen rødlistearter er kjent fra før. Området beites ikke, og er relativt lite (< 5000 m ²).
<i>NINFP2110045369 - Emil Stangs vei 1</i>	
Tilstanden vurderes som moderat på grunn av teigens alder (skogbestandsdynamikk). Teigen er vurdert til gjennomsnittlig hogstklasse 4 (eldre produksjonsskog), med grove overstendere og undersjikt av hasselkratt. Det er noe gran, men ikke over 12,5 %. Busksjiktdekingen er relativt lav under hasselsjiktet (10-25 %), og det ble ikke observert soppangrep. Svak effekt av fremmedarter fra dumpet hageavfallt, blant annet gravmyrt. Noe slitasje grunnet stinett. Det er ingen spor etter ferdsel med tunge kjøretøy.	Lokaliteten er en frisk lågurtedellauvskog med sammenhengende hasselsjikt under overstendere av grove ask, bjørk og furu med sprekkebark. Noe alm, gran, selje og spisslønn - høy variasjon i tresjiktet. Stedvis eldre hassel med sprekkebark og død ved. Feltsjikt stedvis sparsomt utviklet grunnet lite lys til bakken, men med typiske lågurtarter: kranskonvall, teiebær, liljekonvall, kratthumleblom, skogstorkenebb, markjordbær, stankstorkenebb. Oppslag av ask dominerer. Naturmangfold vurderes som stort på grunn av antall store trær (8-16 per daa) og trær med spesielt livsmedium, herunder trær med sprekkebark (8-16 per daa). For øvrig noe død ved av stor dimensjon (1-2 per daa), men ingen habitatspesifikke arter observert. Ingen rødlistearter ble registrert og ingen rødlistearter er kjent fra før. Området beites ikke, og har moderat størrelse (ca. 10 000 m ²).
<i>NINFP2110045385 - Emil Stangs vei 2</i>	
Tilstanden vurderes som moderat på grunn av teigens alder (skogbestandsdynamikk). Teigen er vurdert til gjennomsnittlig hogstklasse 4 (eldre produksjonsskog), med grove overstendere og undersjikt av hasselkratt. Det er noe gran, men ikke over 12,5 %. Busksjiktdekingen er lav under hasselsjiktet (5-10 %), og det ble ikke observert soppangrep eller særlig effekt av fremmedarter. Noe slitasje grunnet stinett, men ingen spor etter ferdsel med tunge kjøretøy.	Lokaliteten er en frisk lågurtedellauvskog med sammenhengende hasselsjikt under overstendere av grove ask, bjørk og furu med sprekkebark. Bjørk på inntil 230 cm omkrets med grov sprekkebark. Innslag av alm, gran, selje, lind og spisslønn. Noe grunnlendt i deler av lokaliteten. Feltsjikt stedvis sparsomt utviklet grunnet lite lys til bakken, men med typiske lågurtarter: kranskonvall, liljekonvall og markjordbær. Oppslag av ask dominerer. Naturmangfold vurderes som stort på grunn av antall store trær (4-8 per daa) og trær med spesielt livsmedium, herunder trær med sprekkebark (8-16 per daa). For øvrig noe død ved av stor dimensjon (0-1 per daa) og enkelte hule lauvtrær (0-1 per daa), men ingen habitatspesifikke arter observert. Ingen rødlistearter ble registrert og ingen rødlistearter er kjent fra før. Området beites ikke, og har moderat størrelse (ca. 14 000 m ²).
<i>NINFP2110045396 - Sykehusstien 1</i>	
Tilstanden vurderes som moderat på grunn av teigens alder (skogbestandsdynamikk). Teigen er vurdert til gjennomsnittlig hogstklasse 4 (eldre produksjonsskog), med grove overstendere og undersjikt av hasselkratt. Det er noe gran, men ikke over 25 %. Busksjiktdekingen er relativt lav under hasselsjiktet (10-25 %), og det ble ikke observert soppangrep eller særlig effekt av fremmedarter. Lite spor etter ferdsel med tunge kjøretøy.	Lokaliteten er en frisk rik edellauvskog med sammenhengende hasselsjikt under overstendere av grove ask og bjørk, samt gran, alm, spisslønn og selje. Feltsjikt stedvis sparsomt utviklet grunnet lite lys til bakken, men med typiske lågurtarter: firblad, markjordbær, trollbær, teiebær og liljekonvall. Naturmangfold vurderes som stort på grunn av antall store trær (4-8 per daa) og trær med spesielt livsmedium, herunder trær med sprekkebark (4-8 per daa). For øvrig noe død ved av stor dimensjon (0-1 per daa), men ingen habitatspesifikke arter observert. Skrukkeøre (NT) er tidligere registrert i området og finnes sannsynligvis der fortsatt, men ble ikke observert ved kartleggingen. Området beites ikke, og har liten størrelse (< 5000 m ²).

<i>NINFP2110045407 - Sykehusstien 2</i>	
Tilstanden vurderes som moderat på grunn av teigens alder (skogbestandsdynamikk). Teigen er vurdert til gjennomsnittlig hogstklasse 4 (eldre produksjonsskog), med grove overstendere og undersjikt av hasselkratt. Det er noe gran, men ikke over 25 %. Busksjiktsdekningen er relativt lav under hasselsjiktet (< 5 %), og det ble ikke observert soppangrep eller særlig effekt av fremmedarter. Ingen spor etter ferdsel med tunge kjøretøy.	Lokaliteten er en frisk lågurtedellauvskog med sammenhengende hasselsjikt under overstendere av grove ask, gran, furu og bjørk. Feltsjikt stedvis sparsomt utviklet grunnet lite lys til bakken, oppslag av ask dominerer. Naturmangfold vurderes som stort på grunn av antall store trær (8-16 per daa) og trær med spesielt livsmedium, herunder trær med sprekkebark (8-16 per daa). For øvrig noe død ved av stor dimensjon (1-2 per daa), men ingen habitatspesifikke arter observert. Ingen rødlistearter ble registrert og ingen rødlistearter er kjent fra før. Området beites ikke, og har liten størrelse (< 5000 m2).
<i>NINFP2110045413 - Sykehusstien 3</i>	
Tilstanden vurderes som moderat på grunn av andelen gran (ca. 40 %). Teigen er vurdert til hogstklasse 5 (gammel produksjonsskog), med grove overstendere og undersjikt av hasselkratt. Busksjiktsdekningen er lav under hasselsjiktet (5-10 %), og det ble ikke observert soppangrep, fremmedarter eller spor etter ferdsel med tunge kjøretøy. Det ligger mye småsøppel i området.	Lokaliteten er en frisk lågurtedellauvskog med høy andel gran. Hasselsjikt med overstendere av ask og gran. Feltsjikt stedvis sparsomt utviklet grunnet lite lys til bakken, men med typiske lågurtarter: liljekonvall, teiebær, markjordbær, trollbær og kranskonvall. Naturmangfold vurderes som stort på grunn av antall store trær (8-16 per daa) og trær med spesielt livsmedium, herunder trær med sprekkebark (8-16 per daa). For øvrig noe død ved av stor dimensjon (2-4 per daa), men ingen habitatspesifikke arter observert. Ingen rødlistearter ble registrert og ingen rødlistearter er kjent fra før. Området beites ikke, og har moderat størrelse (ca. 10 000 m2).
<i>NINFP2110045436 - Dønskistien 1</i>	
Tilstanden vurderes som god. Lokaliteten har gammel normalskog med lav busksjiktsdekning (5-10 %), lav andel gran (< 6,25 %), og er uten fremmedarter, soppangrep og spor etter ferdsel med tunge kjøretøy.	Lokaliteten er en frisk lågurtedellauvskog med alm, ask, spisslønn og grov bjørk og selje. Foruten oppslag av ask finnes kratthumbleblom, mjødurt, kranskonvall og liljekonvall i feltsjikt. Naturmangfold vurderes som stort på grunn av antall store trær (8-16 per daa) og trær med spesielt livsmedium, herunder trær med sprekkebark (8-16 per daa). For øvrig noe død ved av stor dimensjon (1-2 per daa) og enkelte hule lauvtrær (0-1 per daa), men ingen habitatspesifikke arter observert. Ingen rødlistearter ble registrert og ingen rødlistearter er kjent fra før. Området beites ikke, og har liten størrelse (< 5000 m2).
<i>NINFP2110045444 - Dønskistien 2</i>	
Tilstanden vurderes som moderat på grunn av teigens alder (skogbestandsdynamikk). Teigen er vurdert til gjennomsnittlig hogstklasse 4 (eldre produksjonsskog), med grove overstendere og undersjikt av hasselkratt. Det er lite gran (< 6,25 %). Busksjiktsdekningen er relativt lav under hasselsjiktet (5-10 %), og det ble ikke observert soppangrep eller fremmede arter. Ingen	Lokaliteten er en frisk lågurtedellauvskog med hasselsjikt under overstendere av ask, spisslønn, alm, bjørk, selje, osp og gran. Feltsjikt stedvis sparsomt utviklet grunnet lite lys til bakken, men med typiske lågurtarter: kranskonvall, liljekonvall, skogstorkenebb, kratthumbleblom, skogvikke og markjordbær. Naturmangfold vurderes som stort på grunn av antall store trær (8-16 per daa) og trær med spesielt livsmedium, herunder trær med sprekkebark (8-16 per daa). For øvrig noe død ved av stor dimensjon (1-2 per daa) og enkelte hule lauvtrær (0-1 per daa), men ingen habitatspesifikke arter observert. Ingen rødlistearter

spor etter ferdsel med tunge kjøretøy, men en del slitasje etter menneskelig aktivitet, særlig i sørøstlig del.	ble registrert og ingen rødlistearter er kjent fra før. Området beites ikke, og har moderat størrelse (ca. 16 000 m ²).
<i>NINFP2110046778 - Helgerud 1</i>	
Tilstanden vurderes som moderat på grunn av teigens alder (skogbestandsdynamikk) - den er vurdert til gjennomsnittlig hogstklasse 4 (eldre produksjonsskog). Det er lite gran (< 6,25 %) og lav busksjiksdekning (5-10 %). Det ble observert soppangrep på spisslønn, men ingen synlig bestandsreduksjon. Svak effekt av fremmedarter i form av mongolspringfrø langs gangveien. Ingen spor etter ferdsel med tunge kjøretøy.	Lokaliteten er en frisk lågurtedellauvskog med flere store, grove trær innimellom hasselkratt og yngre tresjikt. Tresjiktet består i hovedsak av alm, ask, hassel og spisslønn. Det står grove alm og ask ut mot gangveien sørøst for lokaliteten, som nok er rester av en gammel allé/parklandskap. På en av almetrærne (hul) ble det registrert skumkjuke (EN). Enkelte store grove trær også inne i lokaliteten, med forekomster av labyrintkjuke og lønnkjuke. Feltsjikt stedvis sparsomt utviklet grunnet lite lys til bakken, men med typiske lågurtarter. Oppslag av ask dominerer. Naturmangfold vurderes som stort på grunn av forekomst av rødlistet art (kategori EN), samt antall store trær (4-8 per daa) og trær med spesielt livsmedium, herunder trær med sprekkebark (8-16 per daa). For øvrig noe død ved av stor dimensjon (1-2 per daa) og enkelte hule lauvtrær (1-2 per daa), men ingen habitatspesifikke arter observert. Ingen rødlistearter var registrert fra før, men det ble observert skumkjuke (EN) ved kartleggingen. Området beites ikke, og har liten størrelse (< 5000 m ²).
<i>NINFP2110046772 - Helgerud 2</i>	
Tilstanden vurderes som moderat på grunn av teigens alder (skogbestandsdynamikk) - den er vurdert til gjennomsnittlig hogstklasse 4 (eldre produksjonsskog). Det er lite gran (< 12,5 %) og lav busksjiksdekning (5-10 %). Det ble observert soppangrep på spisslønn, men ingen synlig bestandsreduksjon. Svak effekt av fremmedarter (mongolspringfrø spredt, noe snøbær). Noe spor etter ferdsel med tunge kjøretøy i kantområdene ut mot bebyggelsen. I kanten mot boligfeltet nord for lokaliteten er det en del søppel og hageavfall.	Lokaliteten er en frisk lågurtedellauvskog med variert tresjikt: stedvis dominert av hassel, men også med mye spisslønn, ask, alm, gran, furu, selje og bjørk. Granstubber vitner om plukkhogst, sannsynligvis i forbindelse med utsyn fra tilgrensende blokker. Det er også spor etter av gamle grove edelløvtrær er felt. Stedvis en del død ved, med bl.a. seljekjuke og rustkjuke. Feltsjikt stedvis sparsomt utviklet grunnet lite lys til bakken, men med typiske lågurtarter: kratthumleblom, liljekonvall, svaleurt og kranskonvall. Oppslag av ask dominerer. Naturmangfold vurderes som stort på grunn av antall store trær (8-16 per daa) og trær med spesielt livsmedium, herunder trær med sprekkebark (8-16 per daa). For øvrig noe død ved av stor dimensjon (2-4 per daa) og enkelte hule lauvtrær (1-2 per daa), men ingen habitatspesifikke arter observert. Ingen rødlistearter ble registrert og ingen rødlistearter er kjent fra før. Området beites ikke, og har moderat størrelse (ca. 10 000 m ²).
<i>NINFP2110046771 - Hamangskogen 1</i>	
Tilstanden vurderes som moderat på grunn av teigens alder (skogbestandsdynamikk) - den er vurdert til gjennomsnittlig hogstklasse 4 (eldre produksjonsskog). Det er lite gran (< 6,25 %) og lav busksjiksdekning (< 5 %). Det er ikke observert fremmedarter, soppangrep eller spor etter ferdsel med tunge kjøretøy.	Naturmangfold vurderes som stort på grunn av antall store trær (4-8 per daa) og trær med spesielt livsmedium, herunder trær med sprekkebark (8-16 per daa). For øvrig noe død ved av stor dimensjon (2-4 per daa) og enkelte hule lauvtrær (1-2 per daa), men ingen habitatspesifikke arter observert. Det er registrert skrukkeøre (NT) sørvest i lokaliteten. Arten ble ikke observert ved kartleggingen, men det er ingen grunn til å tro at den ikke finnes i området. Området beites ikke, og har moderat størrelse (ca. 10 000 m ²).

<i>NINFP2110046954 - Hamangskogen 2</i>	
Tilstanden vurderes som moderat på grunn av teigens alder (skogbestandsdynamikk), som er vurdert til gjennomsnittlig hogstklasse 4 (eldre produksjonsskog), samt på grunn av spor etter ferdsel med tunge kjøretøy (1/16-1/2). Det går flere brede opparbeidede stier gjennom lokaliteten. Det er ellers lite gran (< 6,25 %) og lav busksjiksdekning (< 5 %). Det er ikke observert fremmedarter eller soppangrep.	Naturmangfold vurderes som stort på grunn av antall store trær (8-16 per daa) og trær med spesielt livsmedium, herunder trær med sprekkebark (8-16 per daa). For øvrig noe død ved av stor dimensjon (1-2 per daa) og enkelte hule lauvtrær (0-1 per daa), men ingen habitatspesifikke arter observert. Ingen rødlistearter ble registrert og ingen rødlistearter er kjent fra før. Området beites ikke, og har moderat størrelse (ca. 10 000 m2).
<i>NINFP2110045841 - Hamangskogen 3</i>	
Tilstanden vurderes som moderat på grunn av teigens alder (skogbestandsdynamikk), som er vurdert til gjennomsnittlig hogstklasse 4 (eldre produksjonsskog). Det er ellers lite gran (< 6,25 %) og lav busksjiksdekning (5-10 %), og ikke observert fremmedarter eller soppangrep. Det er spor etter ferdsel med tunge kjøretøy i forbindelse med opparbeidet sti gjennom lokaliteten (ca. 1/16).	Naturmangfold vurderes som stort på grunn av antall store trær (4-8 per daa) og trær med spesielt livsmedium, herunder trær med sprekkebark (8-16 per daa). For øvrig lite død ved av stor dimensjon (1-2 per daa), få hule lauvtrær (0-1 per daa), og ingen habitatspesifikke arter observert. Ingen rødlistearter ble registrert og ingen rødlistearter er kjent fra før. Området beites ikke, og har liten størrelse (3500 m2).
<i>NINFP2110046776 - Dønshitoppen 1</i>	
Tilstanden vurderes som god. Lokaliteten er en gammel normalskog med lite gran (< 6,25 %), lav busksjiksdekning (< 5 %), og uten fremmedarter. Det ble observert soppangrep, men ingen synlig bestandsreduksjon. Det er spor etter ferdsel med tunge kjøretøy i forbindelse med opparbeidede stier gjennom lokaliteten (ca. 1/16), og en del småsøppel.	Lokaliteten er en frisk lågurtedellauvskog i sørøstvendt skråning, med hasselsjikt under mange grove ask, spisslønn og alm. Raggkjuke og hasselkjuke observert. Feltsjikt stedvis sparsomt utviklet grunnet lite lys til bakken, men med typiske lågurtarter. Naturmangfold vurderes som stort på grunn av antall store trær (8-16 per daa) og trær med spesielt livsmedium, herunder trær med sprekkebark (16-32 per daa). For øvrig noe død ved av stor dimensjon (2-4 per daa), enkelte hule lauvtrær (1-2 per daa), men ingen habitatspesifikke arter. Ingen rødlistearter ble registrert og ingen rødlistearter er kjent fra før. Området beites ikke, og har moderat størrelse (> 5000 m2).
<i>NINFP2110046773 - Dønshitoppen 2</i>	
Tilstanden vurderes som moderat på grunn av teigens alder (skogbestandsdynamikk), som er vurdert til gjennomsnittlig hogstklasse 4 (eldre produksjonsskog). Deler av området har yngre skog, men grove overstandere veier opp. Det er ellers lite gran (< 6,25 %), og relativt lav busksjiksdekning (10-25 %). Det er ikke observert fremmedarter eller soppangrep. Det er	Lokaliteten er en frisk lågurtedellauvskog med hassel og salix under overstandere av edellauvtrær (mest spisslønn) og bjørk. Feltsjikt sparsomt utviklet grunnet lite lys til bakken. Oppslag av ask dominerer. Naturmangfold vurderes som stort på grunn av antall trær med spesielt livsmedium, herunder trær med sprekkebark (4-8 per daa). For øvrig noen store trær (2-4 per daa) og enkelte læger (0-1 per daa) og hule lauvtrær (0-1 per daa), men ingen habitatspesifikke arter. Ingen rødlistearter ble registrert og ingen rødlistearter er kjent fra før. Området beites ikke, og har moderat størrelse (> 5000 m2).

spor etter ferdsel med tunge kjøretøy i forbindelse med opparbeidede stier gjennom lokaliteten (ca. 1/16).	
<i>NINFP2110046775 - Dønskitoppen 3</i>	
Tilstanden vurderes som moderat på grunn av teigens alder (skogbestandsdynamikk), som er vurdert til gjennomsnittlig hogstklasse 4 (eldre produksjonsskog). Det er ellers noe gran (< 12,5 %), men lav busksjiktsdekning (5-10 %). Det er ikke observert fremmedarter, men noe soppangrep uten at dette har medført bestandsreduksjon. Det er spor etter ferdsel med tunge kjøretøy i forbindelse med opparbeidet sti gjennom lokaliteten (ca. 1/16).	Lokaliteten er en frisk lågurtedellauvskog med spisslønn, hassel, ask, selje og alm, samt noe gran og bjørk - særlig i kantene. Stedvis dominerer ung gråor eller osp, avhengig av lokal variasjon i fuktighet. Bjørk og selje overtar som dominerende treslag i nord og vest. En del død ved, spesielt i forbindelse med etablering av nettinggjerde ut mot stup i vest. Putekjuke og rustkjuke observert. Feltsjikt sparsomt utviklet grunnet lite lys til bakken. Oppslag av ask dominerer. Naturmangfold vurderes som stort på grunn av antall store trær (4-8 per daa) og trær med spesielt livsmedium, herunder trær med sprekkebark (8-16 per daa). For øvrig noe liggende død ved av stor dimensjon (1-2 per daa) og noen hule lauvtrær (1-2 per daa), men ingen habitatspesifikke arter. Ingen rødlistearter ble registrert og ingen rødlistearter er kjent fra før. Området beites ikke, og har moderat størrelse (ca. 10 000 m ²).
<i>NINFP2110046777 - Dønskitoppen 4</i>	
Tilstanden vurderes som moderat på grunn av teigens alder (skogbestandsdynamikk), som er vurdert til gjennomsnittlig hogstklasse 4 (eldre produksjonsskog). Det er ellers lite gran (< 12,5 %) og lav busksjiktsdekning (5-10 %). Det er ikke observert fremmedarter eller soppangrep. Det er spor etter tunge kjøretøy i forbindelse med gammel planering, men området har gått tilbake til skog i dag.	Naturmangfold vurderes som stort på grunn av antall store trær (4-8 per daa) og trær med spesielt livsmedium, herunder trær med sprekkebark (8-16 per daa). For øvrig noe liggende død ved av stor dimensjon (1-2 per daa) og noen hule lauvtrær (1-2 per daa), men ingen habitatspesifikke arter. Ingen rødlistearter ble registrert og ingen rødlistearter er kjent fra før. Området beites ikke, og har liten størrelse (ca. 1000 m ²).
<i>NINFP2110048555 - Dønskitoppen 5</i>	
Tilstanden vurderes som moderat på grunn av teigens alder (skogbestandsdynamikk), som er vurdert til gjennomsnittlig hogstklasse 4 (eldre produksjonsskog), samt spor etter ferdsel med tunge kjøretøy i forbindelse med opparbeidet sti gjennom lokaliteten (1/16-1/2). Det er for øvrig noe gran (inntil 25 %), og lav busksjiktsdekning (5-10 %). Det er ikke observert fremmedarter eller soppangrep.	Lokaliteten er en frisk lågurtedellauvskog med spisslønn, hassel, ask og alm, samt noe gran og bjørk. Feltsjikt er sparsomt utviklet grunnet lite lys til bakken, og oppslag av ask dominerer. Typiske lågurtarter forekommer, slik som kranskonvall og kratthumleblom. Naturmangfold vurderes som stort på grunn av antall store trær (8-16 per daa) og trær med spesielt livsmedium, herunder trær med sprekkebark (8-16 per daa). For øvrig finnes noe liggende død ved av stor dimensjon (ca. 2 per daa) og noen hule lauvtrær (1-2 per daa), men ingen habitatspesifikke arter. Ingen rødlistearter ble registrert og ingen rødlistearter er kjent fra før. Området beites ikke, og har liten størrelse (< 5000 m ²).

